

## University of Groningen

### Renale dwerggroei

Han, Tjiong Njan

**IMPORTANT NOTE:** You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1939

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Han, T. N. (1939). *Renale dwerggroei*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

**Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

**Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN.

1. Alle kinderen, die voor een orthopaedische correctie van genu valgum in aanmerking komen, moeten zorgvuldig urologisch worden onderzocht.
2. Het is gewenscht om bij blaassteenlijders het bestaan van een vitamine-A-deficiëntie op te sporen.
3. Rachitis behandel men liever met bestraling door middel van ultraviolet licht dan met orale toediening van D vitamine.
4. De naam „sacraalvlek” is juister dan het woord „mongolenvlek”.
5. De zoogenaamde „loodlijn” in het röntgenbeeld van verschillende beenderen bij kinderen, lijdende aan loodvergiftiging, berust op kalkafzetting.
6. De diagnose één- of twee-eiige tweelingen, in de zuigelingenperiode gesteld, vereischt, als het kind eenige jaren ouder is geworden, verificatie.
7. Bij het ontstaan van een haemorrhagisch infarct in de baarmoeder, tengevolge van een poging tot crimineelen abortus door middel van een zeepoplossing, speelt de daardoor veroorzaakte vasomotorische stoornis een belangrijke rol.
8. Voor het sluiten van kleine defecten aan de onderlip maken men gebruik van de methode van Estlander.
9. Icterus gravior familiaris wordt waarschijnlijk door een intoxicatie veroorzaakt.

10. Niettegenstaande de bezwaren, door Danielopolu geopperd, kan men de stlectomie voor de chirurgische behandeling van angina pectoris aanbevelen en verrichte men deze liefst volgens de techniek van Gask en Ross.
11. De postoperatieve crisis bij patiënten met hyperparathyreoidie, bekend onder den naam „acute Basedow”, wordt waarschijnlijk door een functiestoornis in de bijnier ont- ketend.
12. Het is te betwijfelen, of de term fibroadenomyxoma phyl- lodes mammae beter is dan cystosarcoma phyllodes mammae.
13. In gevallen van chronische pyodermie, met ondermijning van de oppervlakkige huidlagen, moet rekening worden ge- houden met de mogelijkheid van melioidosis.
14. In de filmkunst vormt het geluid geen tegennatuurlijk element.